

ଆମ ଗୋରୁ ଚରୁଆ



ଡାକ୍ତର କମଳା ପାତ୍ର

ଆମ ରୋଗର ରହସ୍ୟ

ଲେଖିକା :

ଡାକ୍ତର କମଳା ପାତ୍ର



ଏସ୍.ଏ ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ
ବିନୋଦ ବିହାରୀ,
କଟକ-୭୫୩୦୦୧

ଆମ ସ୍ବେଚ୍ଛାର ରହସ୍ୟ

ଲେଖିକା : ଡାକ୍ତର କମଳା ପାତ୍ର

ଶରୀର ରଚନା ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, କଟକ

ପ୍ରକାଶକ : ଶ୍ରୀ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ନନ୍ଦ

ଏସ୍‌କି ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ବିନୋଦ ବିହାରୀ, କଟକ-୭୫୩୦୦୨

ମୁଦ୍ରଣ : ସୁବି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ, କଟକ-୭୫୩୦୧୨

ପ୍ରକାଶନ କାଳ : ୧୯୮୯

ମୂଲ୍ୟ-ଟ ୭.୦୦

ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପଢ଼େ

ସେଗ ଦେଉଛି ମଣିଷର ଚର ଶକ୍ତି । ମଣିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଗରେ ଆହାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଓ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ । ବିଶେଷତଃ ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଣ ଉପରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ସେଗ ବସ୍ତୁରେ ପିତାମାତା ତଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ଉନ୍ନତ ତଥା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିବ । ତେଣୁ “ଆମ ସେଗର ରହସ୍ୟ” ପୁସ୍ତକଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ଭଲ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେଗ କିପରି ହୁଏ, ସେଗର ପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସ୍ତୁରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ି ଜନସାଧାରଣ ତଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତି ସେଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଗର ଭୟାବହତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସେଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ।

ଡଃ. କମଳା ପାତ୍ର

ସୂଚୀପତ୍ର

୧ । ସଙ୍କଳ୍ପର ବା ଇନ୍ଦ୍ରେୟଜ୍ଞା	୪
୨ । ଡିପ୍‌ଥେରିଆ	୫
୩ । ଲହରୀ କାଶ	୭
୪ । ହାଡ଼ପୁଟି	୮
୫ । ମିଳମିଳା	୧୧
୬ । ଗାଲୁଆ	୧୩
୭ । ଯନ୍ତ୍ରା	୧୬
୮ । ହଇଜା	୧୯
୯ । ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ବା ଟାଇଫଏଡ଼	୨୩
୧୦ । ଆମାଗସ୍ତ୍ର ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରୀ	୨୭
୧୧ । ଡାଇରିଆ	୨୯
୧୨ । ପାଳିଜ୍ୱର	୩୨
୧୩ । ବାତଜ୍ୱର	୩୪
୧୪ । ଅକୁଶ କୃମି ବା ହୁକ୍ ଓଁମି	୩୭
୧୫ । ଜିଆ ବା କେଷୁଆ	୩୯

—*—

ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ସୁତରାଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅନଭିଜ୍ଞ । ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ହିଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କେବଳ ମାଗେଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସହିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଫଳରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର, ମନ ଓ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥିତାକୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କୁହା ଯାଇଥାଏ । ସୁତରାଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି କପର ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ; ତାହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରୂପିନିଆଏ ।

ଶରୀର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଖାନା । ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲଦଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରେ । କଲଦଳରେ ଯେପରି ଅଫଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଫଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି । ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲଦଳରେ ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଲେ ତାହା ଯେପରି ଅତଳ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରର ଧୂଳି-ମଳ ପଶିଗଲେ ଶରୀରର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସୁତରାଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକଳ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ରହିବା ଉଚିତ ।

ଆମ ଚକ୍ରପାଣିରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁଦିନ ଧୂଳିମଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ପବନ ସହିତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନାସ ବାୟୁରେ ସେହି ଜୀବାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିମଳ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ । ରକ୍ତରେ ଥିବା ରେଗ ପ୍ରତି-ରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏହି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜୀବାଣୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଘର୍ଷରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଶରୀର ନିଜକୁ ଜୀବାଣୁ-ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ।

ରେଗ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଯଥା— ସାଧାରଣ ରେଗ ଓ ସଂକ୍ରମକ ରେଗ । ଖାଦ୍ୟପାନର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଜନିତ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେହ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯିବା ଆଦି କ ରଣରୁ ଯେଉଁ ରେଗ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ରେଗ କୁହାଯାଏ । ଯଥା— ବହୁମୁତ୍ତ, କୋଷ୍ଠ-କାଠିନ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିମାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ରେଗର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଜ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରେଗ ଜଣକ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଦେହକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସଂକ୍ରମକ ରେଗ କୁହାଯାଏ । ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପାଳିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରମକ ରେଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଜ ଥାଏ ।

ଗଛ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ମାଛ ବିହନ ପରି ସଂକ୍ରମକ ରେଗର ଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ । ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର । ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁ କହନ୍ତି । ହଇଜା ଯକ୍ଷ୍ମା, କଣ୍ଠାଳତ ଇତ୍ୟାଦି ରେଗ ଏହିପରି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଜାଣୁକୁ ଅଣୁ ଗୀଜାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ କୁହାଯାଏ । ସର୍ବଜୀବ, ମିଳିମିଳା, ହାତପୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ରୋଗବାହୀ ଜୀବ ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ସାରିଲ ପରେ ଉକ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରଜାତିର ଦଂଶନ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ

ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ପାଳିକୃର ଓ ବାତକୃର ଛତ୍ୟାଦି ରୋଗ ମାଛ ମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା କୃମି-ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ । କୃମିପୋକର ଡମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ାବାଟେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସହିତ ମିଶି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଦଣିପୋକ, ଆଙ୍କୁଣ କୃମି ଓ କେଷ୍ଟୁଆ ଛତ୍ୟାଦି ଏହି କୃମିପୋକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ରୋଗୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ରୋଗୀକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ରୋଗୀର କାଶ ଓ ଛୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଶ୍ଵାସପଥ, ପରିପାକ ନଳୀ ଏବଂ ତମ୍ପି ଦ୍ଵାରା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ଜନ୍ମାଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏହା କିପରି ପ୍ରସାର ଲଭ କରେ, ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହ ସହଯୋଗୀ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏତ ସତେଜନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ; ସହିତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଦେଶ ତଥା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନର ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲଭ କରିବ ।

ସଦ୍‌ଜ୍ଞର ବା ଇନ୍ଦ୍ରେୟାଞ୍ଜା

ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ରୋଗ । ଏହି ରୋଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂତାତ୍ମ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଶ୍ଵେତ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଏ । ରୋଗୀର ଗଳା ଓ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖଂକାର, ସିଂହାଣି ଓ ଛୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଣୁ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ରହିଥାଏ । ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଛୁମାଳ୍, ତଉଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେ ବ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଦେହ ଡାକ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହୋଇ ଜ୍ଵର ହୁଏ । ନାକରୁ ପାଣି ପରି ସର୍ବି ବାହାରେ । ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ । ରୋଗୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ କି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ । ଜ୍ଵର ବେଳେବେଳେ ୧୦୩ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ୧୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହି ଜ୍ଵର ଯାଆରଣତଃ ସାତ ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରେୟାଞ୍ଜା ଟୀକା ନେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଟୀକା, ରୋଗଦେଶ ଦେବାର ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଏହା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାର ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ନେବା ଦରକାର । ମାତ୍ର ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହି ଟୀକା ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ କମାଇବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇ ନଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ବେଶୀ ଲୋକ ସେହି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ରୋଗୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା

କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଦିନକୁ ୨୩ ଥର ଗଳାକୁ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ
ସଫା କରିବା ଦରକାର । ଏହି ରୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ନଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ରୋଗୀର ଗୁଡ଼ିରେ କଫ ଜମା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ ।

*

କଣ୍ଠ ଅଳତି ବା ଉପଥେରଥା

କଣ୍ଠ ଅଳତି ଗୋଟାଏ ମାରାତ୍ମକ ସାନ୍ଦ୍ରାମକ ରୋଗ । ଏହା ଏକ
ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଯୁଗ୍ମାକାର ସବୁ ଭାଗରେ ଦେଖା-
ଯାଏ । ଏକ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବର୍ଷ ବୟସରୁ
ନଅ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
ଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷର ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗର
ଜୀବାଣୁ ଦୁଷିତ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ, ରୋଗୀର ଛେପ, ଖଜାର, ଛୁଇଁ ପ୍ରଭୃତି
ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥଲୋକର ଶ୍ଵାସପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଜୀବାଣୁ
ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଏହି
ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗ ଫଳରେ ଗଳା ଭିତରୁ ଏକ-
ପ୍ରକାର ଖଟାଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ । ଶ୍ଵାସ ପଥ ମୋଟାଳିଆ ହୋଇଯିବାରୁ
ଶ୍ଵାସପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ଵାସ ପଥ ବନ୍ଦ
ହୋଇ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା ଲବ୍ଧରକାଶ ଚିଆ ଧନୁଷ୍ଟ-
କାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଡି.ପି.ଟି. ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାମରେ
ପରିଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ୩ ମାସ ପରେ ଏକମାସ
ବ୍ୟବଧାନରେ ତିନୋଟି ମାସରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।

ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉଥରେ ଦିଆଯାଏ । ପିଲାଟିଏ ଥଣ୍ଡା କାଶ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ନଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

କୌଣସି ପରିବାରରେ ପିଲାଟିଏ ଡିପ୍ଥେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଜଣା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଉକ୍ତ ପିଲା ତଥା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଳା ଓ ନାକ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ରସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବାଧୁ ତଥା ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଲେକ ପଡ଼ୁଥିବା ଦରେ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀ ରହୁଥିବା ଘରଟିକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଯୋଗଦେଲେ ଡିପ୍ଥେରିଆ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଓ ବିଛଣା ଆଦିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସଫା କରିବା ଦରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବିଧେୟ ।

*

ଲହରୀକାଶ ବା ଡୁପିଙ୍ଗ୍ କାଶ

ଏହା ଏକ ମାରମ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ପରେ ପରେ ଏହା ଅଛୁଣ୍ଡା କାଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଚୀନ୍ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ‘ଶିଫେ ଦିନର କାଶ’ ବୋଲି କହନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ କାଶ ଶେଷରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ‘ହୁର୍’ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବର ସବୁ

ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ୨ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ରୋଗୀର କାଶ, ଲେପ, ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ । ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୁମାଲ ଓ ଚଉଳିଆ ଆଦି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଡାକ୍ତର ଖୁଲି ସାଙ୍ଗ ଓ ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଦେହଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଜଣି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡା ଓ କ୍ଲର ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ତାପରେ କାଶର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହି କାଶ ଘର୍ଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ପିଲା ନିଶ୍ଵାସ, ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବାରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ । କାଶ ଶେଷରେ ଶ୍ଵାସ ନଳୀ ଭିତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାହାରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼େ । ମୁହଁ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ । ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ । ମୁହଁରେ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ପିଲା କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରିପକାଏ । ଖାଇବାପରେ କାଶ ହେଲେ ବାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ, ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହେ । ତାପରେ କାଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କାଶ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ଯେ ପିଲାର ନାକ ଓ ପାଟିବ ଟେ ରକ୍ତ ବାହାରେ । ଆଖିର ଧଳା ଡୋଳା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧର ହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ରୋଗୀ ଆସ୍ଥେ ଆସ୍ଥେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ଥରେ ହେଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦେଶରେ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ଟୀକା ବାହାରିଛି । ଏହି ଟୀକାକୁ ଟ୍ରିପିଲ୍, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍, କୁହାଯାଏ । ଏହି ଟୀକା କଣ୍ଠ ଅଳ୍ପ ଟୀକାପରି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁଳ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଆଲୋକ ପଡୁଥିବା ଏବଂ ପବନ ପିବା ଆସିବା'ର ସୁବିଧା ଥିବା ଘରେ ରୋଗୀକୁ ଏକୂର୍ତ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ । ମେହ ଘର ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରୋଗୀକୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହିଆସିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଓ ସିଂଘାଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ପରେ ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ । କାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଶ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ।

*

ହାତଫୁଟି ବା ପାଣି ବସନ୍ତ

ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ ରୋଗ । ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଗଜାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ହାତଫୁଟି ସାଧାରଣତଃ ଦଶବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ । ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଛଅମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ଏବଂ ଭାର ଲୁଗାପଟା, ବାସନ କୁସନ, ବିଛଣା-ପତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ

କରିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ହାଡ଼ିଫୁଟି ଘା'ର ଶୁଖିଲା ବଳିଲା ଓ କାତ
ଗୁଣ୍ଡି ହୋଇ ପବନରେ ମିଶି ରହିଥାଏ । ସେହି ବାଜାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡି
ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନାସ ବାଟେ ଦେହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ
ଭେଗ ଜନ୍ମାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ଦେହ ଭିତରକୁ ବାଜାଣୁ
ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାତ ଦିନରୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଭେଗର
ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।



ଏହି ଭେଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧେ । ଗୋଡ଼ହାତ
ଘୋଲା ବିଛା କରେ । ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୁଏ । ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାହୁଏ
ନାହିଁ । ଏହପରି ଅବସ୍ଥା ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହେ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଳକୁ ଦେହର ସବୁଆଡ଼େ ମଣା କାମୁଡ଼ା ଦାଗ ପରି
ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଭ୍ର, ପିଠି, ପେଟ,
ପ୍ରଭୃତି ଦେହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ । ପରେ ପରେ ଏହା ହାତ
ଗୋଡ଼ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ନାଲି ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର
ଫୋଟକାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ । ଦୁଇଦିନ ଦିନ
ଭିତରେ ଏହି ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପୂଜଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ
ତାହା ବହୁଳଆ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇଦିନ ପରେ ଏହି
ପୂଜ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ବକଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଚାରି କିମ୍ବା ଛଅ ଦିନପରେ
ବକଳା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ବକଳା ଝଡ଼ିପଡ଼ିବା
ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ହାଡ଼ିଫୁଟି

ଏକ ସମୟରେ ଦେହର ସବୁଆଡ଼େ ନ ବାହାରି ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଥାଏ । ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ଜୁର ହୁଏ । ଏହି ରେଗରେ ଏକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆହାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରହାର ବହୁତ କମ୍ । ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ରେଗର ଭୂତାଶୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆହାନ୍ତ କରି ନିମୋନିଆ ଭଳି ରେଗ ଜନ୍ମାଇଥାଏ । ମା'ର ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ ଯଦି ହାଡ଼ପୁଟି ହୁଏ, ତେବେ ପିଲାଟି ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଆଲୁଅ ଓ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥାନ ଘରେ ରୋଗୀକୁ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ରଖିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀ ରହୁଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କିମ୍ବା ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରୋଗୀର ଆସବାବପତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ରୋଗୀକୁ ସଫା ନରମ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀର ଦେହ ତଥା ବିଛଣାରେ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ପାଉଁଜିର ପକାଇବା ଭଲ । ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚାନିମ୍ବପତ୍ର ବିଛଣାରେ ପକାଇ ସେହି ବିଛଣା ଉପରେ ରୋଗୀକୁ ଶୁଆଇବା ଦରକାର । ରୋଗୀର ଦେହରେ ଥିବା ଘା' ଉପରେ ଯେପରି ମାଛ ନ ବସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀକୁ ମଶାଣି ଭିତରେ ଶୁଆଇବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ଛେପ, ଖଙ୍କାର ତଥା ଶୁଖିଲା ଘା'ରୁ ଗୁଡ଼ୁଥିବା ବକଳା ଗୁଡ଼ୁକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ବିଶୋଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ରଖି ପୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ଦେହରୁ ସବୁ ବକଳା ଓ କାତ ନ ଗୁଡ଼ୁଲ ଫର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଦେହରେ ଥିବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଲାଭିଯିବା ପାଇଁ ଅମ ଦେଶରେ ଅନେକେ ପଇଡ଼ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତରଳ ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା କାଶକଫ ବହୁତ ଦିନ ଫର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ ।

ମିଳିମିଳା

ମିଳିମିଳା ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ । ଏକ ପ୍ରକାର ଅତି ସୁଖ
ଭୁତାଣୁ ଏହି ରୋଗର କାରଣ । ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀର
ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଶରତବର୍ଷରେ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ
ଏହି ରୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ
ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ
ତନି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ତନିବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏହି ରୋଗ
ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଛଅମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଏହି ରୋଗ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତଥାପି ସେ
କୌଣସି ବୟସର ଲେକକୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହି
ରୋଗର ଗଜାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀର କାଶ କମ୍ପା ଛୁଙ୍କ ବେଳେ
ଶ୍ୱାସପଥ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରକୁ ଆସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ରହି-
ଥାଏ । ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୁମାଲ ଓ ଚଉଲିଆରେ ଲାଗି
ଥିବା ଗ୍ରେସ ଓ ସିଂଦୂରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି
ରୋଗର ଗଜାଣୁ ଦେହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ
ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ଏତେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାରେ
ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ରୋଗକୁ
ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଦେହରେ ଦାଗ
ଯିବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଦାଗ ଦେଖାଯିବା ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟି
ସାଧାରଣତଃ ତନି ବୁଦ୍ଧି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ । ରୋଗୀକୁ ଜ୍ୱର
ହୁଏ । ଛୁଙ୍କ ଏବଂ କାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣିପରି ସିଂଦୂରୀ

ବାହାରେ । ଆଖି ନାଲି ଦେଖାଯାଏ । ଏହାପରେ ପାଟି ଭିତରେ ମାଲ ମିଶ୍ରିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ । ରୋଗର ଦ୍ଵିତୀୟା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁହ ଓ ବେକରେ ନାଲି କମ୍ପା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ । ୨/୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଯଥା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଦେଖାଯାଏ । ଦେହ ବହୁତ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ । ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ । ପ୍ରାୟ ୫/୬ ଦିନ ପରେ ଏହି ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହେବାପରେ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ନମୋନିଆ କାନ ପାରିବା, ଆଖି ଧରିବା, ପୁରଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ପିଲିପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥି ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରୁ ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ପିଲି ମୁଖ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଭୂତାଶୁ ଡାକା ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଟୀକାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଂସ ପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ଟୀକା ନେବା ପରେ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲକୁ ଜ୍ଵର ହୋଇଥାଏ । ଦେହ ସାରା ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ୨୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଟୀକା ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଯକ୍ଷ୍ମା, ପିତ୍ତଳା, ଏକ୍ଜିମା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଥିବା ପିଲକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ବେଗୀକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର । ବିଛଣା ଓ ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ପାଉଁଡ଼ର ପକାଇବା ଉଚିତ । ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ନଖରେ

ନ କୁଣ୍ଡାଇ ନିମ୍ନ ପଥ କିମ୍ବା ନରମ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।
 ରୋଗୀର ବାସନ କୁସନ ଅଲଗା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଛଣା ପଥ ଓ
 ଲୁଗାପଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୋଇ ଟାଣ ଖସିରେ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
 ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଛୁମାଲ ଓ ଚଉଲିଆକୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ
 କେହି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀକୁ
 ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା
 ଉଚିତ । ରୋଗୀକୁ ଗରମ ଓ ସୁସ୍ଥିତିର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

*

ଗାଳୁଆ

ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପାବହ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ । ଏକ ପ୍ରକାର
 ସୁକ୍ଷ୍ମ ଭୂକାଣୁ ଦେହରେ ଥିବା ଲସିବାଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ତଥା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ
 ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ
 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ
 ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମକ
 ଆକାର ଧାରଣ କରେ । ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ
 ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
 ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି
 ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ତଥା
 ଗୁଳିଣ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟ
 ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ରୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା
 ନାହିଁ । ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀର କାଗ, ଛୁଙ୍କ ଓ
 ସିଂଦାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶ୍ୱାସ ପଥର
 ଉପରି ଭାଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀଦ୍ୱାରା

ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବାସନ କୁସନ ତଥା ଛୁମାଲ ଓ ତଉଲିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରସାରରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଦେହ ଭିତରକୁ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦୁଇ ତଳ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଥରେ ହେଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହୁଏନାହିଁ । ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ପୁନରାୟ ସେହି ଲୋକକୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ।

କାନମୂଳର ତଳଭାଗ ତଥା ତଳ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟରସ ନିସ୍ଫୁଟ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଫୁଲି ଦରଜ ହେବା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଥମ କାରଣ । ଏକାବେଳେକେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯାଏ । ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଦରଜ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୁଏ । ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଦେ ଓ ଦେହ ହାତ ଘେଲାଇବା କରେ । ରୋଗୀ ପାଟି ଖୋଲିବା ତଥା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚୋବାଇ ଖାଇବାରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ । ଭଲ ଭାବରେ ପାଟି ଭିତର ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଏ ନ ଥିବାରୁ ମୁହଁରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ । ରୋଗୀ କେବଳ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ୩ ଦିନରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ । ସାଧାରଣତଃ ଧୂଆଁ, ହୃତପିଣ୍ଡ, ଆଖି, କାନ, ଶୁଦ୍ଧିକାଟ ପ୍ରଭୃତି କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଲସିବାଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଦରଜ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯାଏ । ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲି ଓ ଦରଜ କମିଯାଏ । ରୋଗୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଟି ମେଲ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚୋବାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ । ମାତ୍ର ଯୁବକ ତଥା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକାଟ ପ୍ରଭୃତି କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ପାଇଥାଏ ।

ବୈଦାନ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆରେ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୀକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଅଛି । ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଟୀକା ଏକ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଟୀକାର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହି ଟୀକା ମଧ୍ୟ ହାତପଟୁ ଓ ମିଳିମିଳା ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସହଜ ମିଶାଇ ଏକା-ବେଳେ ଉନ୍ନୋଟି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଡି. ପି. ଡି. ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପରି ଏକାଥରକେ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ପରି ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଖୋଲ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପଡୁଥିବା ଘରେ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ରଖିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାସନ କୁସନ, ଲୁଗାପଟା ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର । ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲକୁ ବାହାରକୁ ଗୁଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏହାଦ୍ଵାରା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସହଜରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦେହରେ ସବୁଦିନ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରି ବେକ ଓ କାନର ଚାରି-ପଟେ ଗରମ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ । ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ଜୀବାଣୁ-ନାଶକ ଔଷଧ ପକାଇ ରୋଗୀର ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ଚାରିଥର ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା କମିଯାଏ ଏବଂ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ରୋଗୀକୁ ଖାଇ ପେଟରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀର, ବାଲି, ସାଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଖାଦ୍ୟର ସ ନିମ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିର ଉପରି ଭାଗକୁ ବେଲ୍‌ଡନା ପଟି ଦ୍ଵାରା

ଆକୃତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମ ସେକ ଦେଲେ ସୁଧଳ ମିଳିଥାଏ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହୁ ସହିତ କାଇଁତ ଗଛର ପତ୍ର ମିଶାଇ ଫୁଲୁଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ବଛଣା ପତ୍ର ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ଫିନାଇଲ୍ ମିଶା ପାଣିରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣକୁ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଦୂଷିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ବଟିକା ଇଞ୍ଚି ଦିନରୁ ଯାତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

*

ଯକ୍ଷ୍ମା

ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ଜୀବାଣୁ ଜାତ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ । ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ ପାଳିତ ପଶୁ ତଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୟସର ଶ୍ଵା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ରୋଗୀର ଛେପ ଓ ଖଜାରରେ ଜୀବାଣୁ ବାହାରକୁ ଆସି ପବନରେ ମିଶି ରହିଥାଏ । ଏହି ଦୂଷିତ ପବନ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ଵାସ ବାୟୁରେ ଯାଇ ରୋଗ ଜନ୍ମାଇଥାଏ । ରୋଗୀ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ରୋଗୀର ବାସନ କୁସନ ଓ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଫେରିଥାଏ । ଗୋରୁଗାଈ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗ

ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଈର ଶୀରରେ ମଧ୍ୟ ଜବାଣୁ ଥାଏ । ସେହି ଶୀର କଷ୍ଟା କମ୍ପା ଭଲ ଭାବରେ ନ ଫୁଟାଇ ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ।



ପଞ୍ଚା ରୋଗୀ

ଏହି ଜବାଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ରୋଗ ଜନ୍ମାଇ ପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଜାହାଣ ପଟ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ର ଉପରି ଭାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼, ପେଟ ଭିତରର ଅନ୍ତନଳୀ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ବେକ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜ୍ଵର ହୋଇଥାଏ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରୋଗୀକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଏ । ରୋଗୀକୁ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ ହୁଏ । ସକାଳେ କାଶ ବେଶୀ ହୁଏ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ କାଶ ସଙ୍ଗେ କଫ ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ । ଏହି ରୋଗ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ହୁଏ, ତେବେ ବେକରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି

ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ଏହା ପାଟି ସେଥିରୁ ପୁଲ ବାହାରେ । ଏହି ଜୀବାଣୁ ଯଦି ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ଡମେ ଡମେ ଅନ୍ତନଳୀ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ ଓ ବାନ୍ତି ହୁଏ । ରୋଗୀ ପାଟି-ବାଟେ କିଛି ଖାଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଏ ହାଡ଼ଟି ଫୁଲିଯାଏ, ଦରଜ ହୁଏ ଏବଂ ଚଳ ପ୍ରଚଳରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଯଷ୍ଟି ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବି. ସି. ଜି. ଟୀକା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୀକା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୀକା ଦିଆଯାଇ ଦେହର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରା-ଯାଉଅଛି ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗରେ ଆହାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମରେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଔଷଧ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ରୋଗରେ ଆହାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମିଳୁଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରା-ମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ, ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନା ପଇସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଉନ୍ନତ ଚିଣୁଡ଼ ବାୟୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏ ରୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦ୍ଧତି । ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ

ଅଲଗା ଦରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଶୁଆବସା କମ୍ବା
 ଶିଆପିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରୋଗୀ କାଶିଲା, ଛୁଙ୍କିଲା ବା କଥା
 କହିଲା ବେଳେ ମୁହଁକୁ ଛୁମାଲ ବା ସଫାଲୁଗା ଦ୍ଵାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା
 ଉଚିତ । ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣର ଶର, ଅଣ୍ଡା ଓ
 ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ଛେପ,
 ଖଙ୍କାରକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ପରେ
 ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ବିଛଣାପତ୍ର
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ ।

*

ଦୁଇଜା ବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି

ଏହା ଗୋଟିଏ ମାରମ୍ଭକ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଏବଂ ଏକପ୍ରକାର
 ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗ
 ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାରୁତୁର ଆରମ୍ଭରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।
 ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତିରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହି ଝାଡ଼ା
 ଓ ବାନ୍ତିର ସଫଟକରେ ଆସୁଥିବା ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ
 ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଛ
 ଜୀବାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତିରେ ବସି ପରେ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥରେ ବସିଲେ
 ଏହା ଦୁର୍ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ
 ସ୍ଥାନକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗୀ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା
 ଲୁଗାପଟା ଓ ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରସାରର ସହାୟକ
 ହୋଇଥାଏ ।

ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୋଗୀକୁ ଚାଉଳଧୁଆ ପାଣି
 ପରି ପତଳା ଝାଡ଼ା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣିପରି ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।
 ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ୪୦ରୁ ୫୦ଥର ପତଳା ଝାଡ଼ା ଦେବା ଫଳରେ

ସେଗୀ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼େ । ଗାଲ ଓ ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶି-
ଯାଏ । ହାତ ଓ ପାଦ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ । ଦେହର ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଯାଏ ଏବଂ



ହଜିରା ରୋଗୀ

ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର ହୁଏ । ପରିସ୍ରା କରି କରି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ
ଯାଏ । ସେଗୀ ଖରୁ ବ୍ୟତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ । ତନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଡ଼
ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ
ଦେହ ଭିତରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ନିପାତ ଗୋଟି ସେଗୀ
ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାପରେ ସେଗୀର ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ଆସ୍ତେ
ଆସ୍ତେ କରିଯାଏ । ଦେହର ଉତ୍ତପ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ
ଦୁଇରୁ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୀ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ତେ ଲୁହ କରିଥାଏ ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୁଏ । ବହୁତ
ଥର ଝାଡ଼ା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ସବୁ-
ବେଳେ ଶୋଇ ରୁହେ । ବେଳେବେଳେ ପିଲାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଟାଣ ଟାଣ
ହୋଇ ପିତୃଳା ମାରେ ଏବଂ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ହଜିରା ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହଜିରା ପ୍ରତିଷେଧକ
ଟୀକା ନେବା ବିଧେୟ । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କର
ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଟୀକା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ନେବାପରେ
ସେ ପ୍ଲାମଟି ଅଳ୍ପ ଫୁଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଦରଜ ହୁଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ

ଜ୍ୱର ହୁଏ । ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଶାର୍ପ୍ସ୍‌ସ୍ଥାନ, ପାମ୍ପାସ୍ଥାନ ଓ ମେଳା ପ୍ରଭୃତିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ପାମ୍ପାସ୍ଥାନ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୂଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହି ଟୀକା ନେବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜମାଗତ ୧୦ । ୧୨ ଥର ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ହେଲେ ତାହାର ଝାଡ଼ାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଇ କଲେର ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର । ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅଳଗା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ବା ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରୋଗୀର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଘର ପାଖରୁ ଦୂରରେ ଗାତ ଟେକି ଅଳିଆ ପହର ମିଶାଇ ପୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଜଣାଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତର-ଖାନାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ଉଚିତ । ଏହା ଫଳରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ସୁବିଧା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ-ମାନଙ୍କୁ ହଇଜା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇ ରୋଗ କବଳରୁ ସହଜରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ଯେତେକ ମାସାରେ ପାଣି ଦେହ ଭିତରୁ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ସେତେକ ପାଣି ଦେହ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଦେହରେ ଥିବା ପାଣିର ମାତ୍ରାକୁ ସମାନ ପରିମାଣ କରିବା ଏବଂ ହଇଜା ଜୀବାଣୁନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବା । ତେଣୁ ରୋଗୀକୁ ଚିନିପାଣି ସଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଗା ମିଶାଇ ମନଇଚ୍ଛା ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ପଇତ୍ତପାଣି ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଓରସ୍ (ORS) ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଉଁର ପୁଡ଼ିଆ ମିଳୁଛି । ଏକ ଲିଟର ବର୍ଣ୍ଣର ପାଣିରେ ଏହି ପୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା

ପାଉଁଶରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ ଦଣ୍ଡାରୁ ୪ ଦଣ୍ଡା ଅନ୍ତରରେ ରୋଗୀକୁ ପିଛବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଯଦି ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ନହୁଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ତେବେ ତା ଶିରାରେ ଗୁଳିକୋଟ ସେଲୁଲନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ବିଧେୟ । ତା ନ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଉଚିତ । ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି କମି ଆସିଲେ ରୋଗୀକୁ ପତଳା ବାଲି ପିଛବାକୁ ଦେବା ଦରକାର । କ୍ଷମେ କ୍ଷମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଭାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଦୁଧ ସଙ୍ଗେ ଚକଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଗୀ ୫ । ୬ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭି କରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଓ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଏହି ରୋଗ ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଅଣ୍ଟାକରି ପିଛବା ଉଚିତ । ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ସବୁବେଳେ ତଟକା ଓ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର । ବଜାର ତଥା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବାସି, ପରୁସଡ଼ା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଣେ ତେଣେ ଝାଡ଼ା ନ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରେ ମାଛି ଯେପରି ବସି ନ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ବିଧେୟ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ କିପରି ପ୍ରସାର ଲଭି ନ କରି ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ।

*

ଆନ୍ତ୍ରିକଜନ୍ମର ବା ଟାଇଟ୍‌ଏଡ୍.

ଆନ୍ତ୍ରିକଜନ୍ମର କହିଲେ ଟାଇଟ୍‌ଏଡ୍ ଓ ପାରାଟାଇଟ୍‌ଏଡ୍, ରୋଗକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି ରୋଗ ଏକପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଭାରତ-ବର୍ଷରେ ଏହି ରୋଗ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଦ୍ଵାର ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ନୁହେଁ ।

ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନ ଥାଏ । ମହିଳାମାନେ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବାହକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ଓ ପରିସ୍ରାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏହା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥାଏ । ମାଛ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ାରେ ବସିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବସିଲେ ତା ନୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିତ କରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସହଜରେ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଞ୍ଚା ଶରୀର ପିଇଲେ କିମ୍ବା ନାଲିନିର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ୪୫ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦେ । ଦେହ ଘୋଳା-ବିଛା ହୁଏ । ଜର ଜର ଲାଗେ ।

ଖାଇବାକୁ କିଛି ଲଜ୍ଜା ହୁଏନାହିଁ କି ଗାଈରକ ତଥା ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଏନାହିଁ । ଦେହର ଉତ୍ତପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଏହା ୧୦୩୦ ରୁ ୧୦୪୦ ଫର୍ମିନ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱର ମଝିରେ ମଝିରେ ସାମାନ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିକ ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଝାଡ଼ା ସମା ହୁଏନାହିଁ । ମାତ୍ର ଘରେ ପାଣି ପରି ପତଳା, ମାଟିଆ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ କିଭର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ ବନ୍ଦଳିଆ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ରୋଗୀର ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବାମ ପଟ ପେଟ ଚିପିଲେ ଦରଜ ଲାଗେ । ରୋଗୀର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇଫଏଡ଼” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗୀର ଦେହ ହାତ ଥରିବା, ଅପସ୍ମ କଥାଗ୍ରସ୍ତା, ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯିବା ଏବଂ ବଛଣାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ରୋଗୀର ନିଦ ଫମେ ଫମେ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହି ରୋଗ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବପରି ଫମାଗତ ନ ହୋଇ ପାଳିଜ୍ୱର ଭଳି ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଓ କମ୍ପିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ା ହୁଏ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଥିଲବେଳେ ପିତ୍ତଳା ମାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଟୀକାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟୀକା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବୁରି ସପ୍ତାହରୁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଥର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଟୀକା ନେବା ପରେ ଦେହ ହାତ ଘୋଳା-ବିଛା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ଜର ଜର ଲାଗେ । ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଜାଗାଟି ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲି ଦରଜ ଓ ବିଛା ହୁଏ । ଏହି ଟୀକା ଟାଇଫଏଡ଼ ରୋଗୀକୁ ପୂରାପୂରି ନିରୋଧ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ତା' ସଙ୍ଗେ ବସାଉଠା, ଖିଆପିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ ଯେପରି ଘରର ଅନ୍ୟ-ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା, ପରିସ୍ରା, ବାନ୍ତି, ଛେପ ଓ ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଣେ-ତେଣେ ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପାତରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଏହାକୁ ପକାଇ ଅଳିଆ ସହିତ ମିଶାଇ ପୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଓ ବାସନ କୁସନ ନଈ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ନ ଧୋଇ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଘରେ ଧୋଇବା ବିଧେୟ । ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟ-ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀକୁ ଶୀର, ଫଳରସ, ବାଲି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଦେହର ଉତ୍ତାପ ୧୦୨°ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହ ହାତ ଧୋଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଫ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପଟି ଦେଇ ଜ୍ୱର ଯେପରି କମିଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏହି ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଜ୍ୱର କମିଗଲେ ରୋଗୀକୁ ବିଷ୍କୂଟ, ପାଉଁରୁଟି, ଦୋରନ୍ଦା ଭାତ ଓ ଦରସିଦା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖବର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲ ତଥା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଟାଇଫଏଡ଼ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଉଚିତ । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ କୂଅ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବା ପାଉଁର ପକାଇବା ଦରକାର । ସଦାସର୍ବଦା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଉଚିତ । ମାଛ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ନ ବସନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମ ଓ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ।

ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଓ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ । ହାଟବଜାର ତଥା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ତଥା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯେତେବୃତ୍ତ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତନ ଥିବା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବିଧେୟ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

*

ଆମାଗସ୍ତ୍ର ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି

ଆମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇପ୍ରକାରର ଆମାଗସ୍ତ୍ର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା : ଆମିବକ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବାସିଲେରି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି । ଏହି ରୋଗକେତକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଏହା ବିବେଚିତ । ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶତକଡ଼ା ୧୫ ଭାଗ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଆବର୍ଜନା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ବମ୍ବେ, ଲକ୍ଷ୍ନୋ, କଲିକତା, ଅମୃତସର ତଥା କାନପୁର ପ୍ରଭୃତି ସହରରେ ଏହି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ଆମାଗସ୍ତ୍ର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଜୀବାଣୁ ପାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀର ନଖ ସହିରେ ଏହି ଜୀବାଣୁମାନେ ଆସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି । ନାଲି ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଚିନିପରିବା କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝାଇ ଖାଇଲେ ଜୀବାଣୁମାନେ ଦେହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ମାଛ ଜୀବାଣୁପୂର୍ଣ୍ଣ

ଝାଡ଼ାରେ ବସିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦୂଷିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭୋଗରେ ଆନ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଭୋଗ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଦରିଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶିଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚେତନ ନ ଥିବା ସହରଚଳ ଓ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଖୋଲ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଥରକୁ ଥର ଝାଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେଟ ଟାଣିବା, ମଳଦ୍ୱାର ବ୍ୟଥା ହେବା ଓ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅବଶ ଲାଗିବା ଏହି ଭୋଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ । ଝାଡ଼ାରେ ମଳ ସହିତ ନାଳ ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଆମିବକ୍ ଡିସେଣ୍ଡ୍ରୀରେ ଅଳ୍ପଥର ଝାଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ାରେ ମଳ ପରିମାଣ ବେଶୀ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନାଳ ଓ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ । ଝାଡ଼ା ଖଟାଳିଆ ଗଛ ହୁଏ । ମାଟ ବେସିଲେରି ଡିସେଣ୍ଡ୍ରୀରେ ଘନ ଘନ ଝାଡ଼ା ହୁଏ । ଝାଡ଼ାରେ ମଳର ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ଥାଏ । କଞ୍ଚାବକ୍ତ ଓ ନାଳ ମଳ ସହିତ ନ ମିଶି ପରେ ଅଲଗା ପଡ଼ିଥାଏ । ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ରୁହେ । ଆମାଗସ୍ତ ଝାଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ୩ ଦିନରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ । ମାଟ ଉପସ୍ଥଳ ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବରୁ ଏହି ଭୋଗର ଜୀବାଣୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପେଟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହାକୁ ସବଦା ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବା ଉଚିତ । ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ତଟକା ଓ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜାଇ ଘରର ଚରିଷ୍ଟାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା

ବିଧେୟ । ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ହିତକର । କଞ୍ଚା ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଦରକାର । ଓଷ୍ୟେକ ଥର ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ପରେ ହାତକୁ ମାଟିରେ ନ ଘଷି ସାବୁନ ଓ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ । ନମେଲ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ପ୍ରତି ବର୍ଗେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । କାରଣ ଆମାଗୟୁ ଜୀବାଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗି କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ବିଧେୟ । ଖୋଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏଣେତେଣେ ଝାଡ଼ା ନ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ଝାଡ଼ାଫେରି ତା ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ଫଳରେ ମାଛୁ ଝାଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପାରେନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ ।

ଏହି ରେଗରେ ଆହାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବା ବିଧେୟ । ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀକୁ ବାଲି, ସାବୁ ପ୍ରଭୃତି ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ପେଟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦରଜ କମାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେବା ଦରକାର । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ରେଗର ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯକୃତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଝାଡ଼ା ସ୍ବାଭାବିକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩/୪ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର । କଞ୍ଚା ବେଲ ପୋଡ଼ା ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

*

ତରଳ ଝାଡ଼ା ବା ଡାଇରୀଆ

ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀରରେ ତରଳ କମ୍ପା ପାଣି ପରି ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଏହାକୁ ଡାଇରୀଆ କୁହନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ । ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଷିତ ପାଣି, ଦୁଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ପରୁଷତା ଫଳମୂଳ, ମାଛ ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ୱ୍ୟକ୍ଷତ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମା' ଶୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧୁ ମିଳୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବୋତଲରେ ପିଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ତରଳ ଝାଡ଼ାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥିବା ବୋତଲ ଓ ରବର ନଳୀରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୀର ସହିତ ଶିଶୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ଜନ୍ମାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଘର ପାଖରେ କମ୍ପା ପୋଖରୀ ହ୍ରଦରେ ଝାଡ଼ାଗଲେ ଏହା ପରିମଳ ଦୁଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୁଷିତ କରିଥାଏ । ଦୁଷିତ ପରିବେଶରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ପାନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ରୋଗ ଆରମ୍ଭରେ ରୋଗୀକୁ ଏକାଧିକ ଥର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ । ଏହି ଝାଡ଼ାରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ । ଫଳରେ ଜଳ ସହିତ ଲବଣାଂଶ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଶରୀରରେ ଜଳ-ଶୁଷ୍କତା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଝାଡ଼ା ସହିତ ବାନ୍ତି ହୁଏ । ଦେହର ଉତ୍ତପ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ । ଝାଡ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ । ରୋଗୀ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଏ । ସବୁବେଳେ

ଗୋଈଁବାକୁ ଛଜ୍ଜା କରେ । ଆଖି ଶୁଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଧାର ନଥାଏ । ଜିଭ ଶୁଖିଯାଏ । ବହୁତ ଗୋଷ ଲଗେ । ଦେହ ହାତର ଚର୍ମ ଶୁଖି ସେଥିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଯାଏ । ପେଟ ପାମି ଯାଏ ।



ପିଲାଟି ଅଳ୍ପ ପରିସ୍ରା ହୁଏ କିମ୍ବା ଜମାରୁ ପରିସ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱକଟଜନକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଶୁ ପ୍ରତିକାର କର ନଗଲେ ଗୋଟିଏ ଅକାଳ ମୁତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦିଟିପାରେ ।

ଏହି ଗୋରୁର ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଦେହରୁ ଯେତକ ପରି-ମଣ୍ଡେ ପାଣି, ଝାଡ଼ା ସହିତ ବାହାର ଯାଇଥାଏ, ସେତକ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେହ ଭିତରକୁ ଯେପରି ଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । ତେଣୁ ଶିଶୁ ମା' ଶୀର ପିଉଥିଲେ ତାହାର ଛଙ୍କାନ୍ତୁପାୟୀ ଶୀର ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ପାଣିକୁ ପୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଭଲ । ଲେମ୍ବୁପାଣି, ପଇତ୍ତପାଣି କିମ୍ବା ଚା ପୁଟା ପାଣି * ମିନିଟରୁ ୧୦ ମିନିଟ ଅନ୍ତରରେ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହାଛଡ଼ା ଚାରି ଚାମୁଚ ଚିନି ଓ ଅଧ ଚାମୁଚେ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣକୁ ଅଧ ଲିଟର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଗୋଟିକୁ ଥରକୁ ଥର ପିଇବାକୁ ଦେବା ବିଧେୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଓ. ଆର୍. ଏସ୍. ଗୁଣ୍ଡ ପୁଡ଼ିଆ ଏକ ଲିଟର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଚାମୁଚ

ଦ୍ଵାରା ଗୋଲାଈବା ଉଚିତ । ଗ୍ରେଟ ଛୁଆ ଓ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ ଅନ୍ତରରେ ୨ ରୁ ୪ ଗୁମୁତ ପାମ୍ପସ୍ତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଦା ମୁଦାବକ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ କମ୍ପା ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଦେଗାଗଲେ ନିନିଟସ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବିଧେୟ । ସାଧାରଣତଃ ଝାଡ଼ା କମିଯିବା ପରେ ପିଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଲେଖା ଏ ଅରୁ ଥର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ହାତପକ୍ଷ କମ୍ପା ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସବୋଲିଷ୍ଟ । ତା ନ ହେଲେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଅଣ୍ଡା କରି ପରିଷ୍କାର ପାସରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ପିଇବା ଉଚିତ । ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ । ସବୁଦିନ ଗରମ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଭଲ । ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମାଛ ସେପରି ବସି ନ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ଖାଇବା କମ୍ପା ରୋଷାଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଧୋଇବା ଉଚିତ । ଝାଡ଼ା ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିଶୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୀର ବୋତଲ, କପ୍, ଗୁମୁତ ଓ ଗ୍ଲ୍ୟାସକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ରଖିବ ଉଚିତ । ପାଇଖାନାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ସବୁଦିନ ବାଞ୍ଛନୀୟ । ପାଇଖାନାରେ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଘର ପାଖରୁ ତଥା ପିଇବା ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନର ବଡ଼ ଦୁରରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଯାଇ ତାହାକୁ ମାଟି ଦ୍ଵାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେଥିରେ ମାଛ ବସି ନ ପାରନ୍ତି । ଖୋଲ ପଡ଼ିଆ ନ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ଖୋଳ ସେହି ଗାଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଫେରି ତାହାକୁ ପରେ ଅଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପୂରାଇ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ।

ପାଳିକୃର

ଏହା ଏକ ସଂହାସକ ଶ୍ରେଣୀ । ପାଳିକର ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଜୁର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଳିକୃର କୁହାଯାଏ । ପୃଥ୍ବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଫସଲର ମ୍ୟାଲେରିଆ କୀଟାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ଵାରା ଜୀବିତ ରୁଡ଼ିକ ରୋଗୀ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ରକ୍ତକୁ ଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ରକ୍ତରୁ ଯାଇ ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶରୀରରୁ ଘନିଭୂତରେ ବଢ଼ି ପୁଣି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ରକ୍ତ କଣିକା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ରକ୍ତ କଣିକା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏମାନେ ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଟିର ଜୀବିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାଛ ମଶା ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ବେଳେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଥାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଭୟ ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଟିର ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି । ମଶା ପେଟ ଭିତରେ ଏମାନେ ରକ୍ତକଣିକା ଭିତରୁ ବାହାର ବାହାରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଆନ୍ତି । ମଶା ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କେତେକ ମଶାର ମୁହଁ ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ମଶା ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼େ, ଏହି ନୂଆ ଜୀବିତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗ ଯେ କୌଣସି ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ହେଁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ରୋଗର ଜୀବିତ ଘାତ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଥରକୁ ଥର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ।

ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧର ଜନ୍ମର, ଶୀତ ଓ କମ୍ପ । ଏହି ଜନ୍ମର ସାଧାରଣତଃ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ, ଦୁଇଦିନ ଛଡ଼ା ଦିନେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଳକର ହୋଇଥାଏ । ଜନ୍ମର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦେହରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଝାଳ ବାହାରି ଜନ୍ମରର ଉତ୍ତପ୍ତ କମିଯାଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ । ଏହି ରୋଗର ଲାଟାଣୁ ମଫ୍ରିଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରୋଗୀ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ପାଳଜନ୍ମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପିଲ୍ଲା ବଢ଼ିଯାଏ, ରକ୍ତ-ହୀନତା ଘଟେ ଏବଂ ରୋଗୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଜନ୍ମର ଥିଲା-ବେଳେ ରୋଗୀର ଦେହ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧିରେ ଧୋଇ ପୋଛି ଦେବା ଦରକାର । ରୋଗୀକୁ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁରସ, ଶର ଓ ବାଲି ପ୍ରଭୃତି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର । ଜନ୍ମର ପୁରୁଷର ଭଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦରକାରୀ ଦେବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ମଣା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଣାର ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଉଚିତ । ଘର ଭୂମିପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ବୁଦା, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ଓ ମାଠିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଜମିଥିବା ପାଣିରେ ମଣା ଡିମ୍ବ ଦେଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଘର ଭିତରେ, ଅଳିଆ ଗଦା, ଗୋବର ଖାତ, ଗାଡ଼ିଆ ଓ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଲାଟାଣୁନାଶକ ଡି.ଡି.ଟି ନିୟମିତ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣା ବଂଶ ଲେପ ପାଇଥାଏ । କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଗଲେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ-ମାରଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର । ଆମ ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ହେବାର ଜାଣିଥିବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରା-କରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ପଇସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବର୍ଷକୁ

୨ଥର କରି ଡି.ଡି.ଟି. ପକାଇବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଳନଦୀମାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା; ଜନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ।

*

ବାତଜ୍ୱର

ଏହି ଜ୍ୱର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବକୁ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୁଏ । ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ସମୁଦ୍ରପାଖ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ୨ ବର୍ଷରୁ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ।

ମାଈ କୁ୍ୟଲେକ୍ତ ମଣା ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନିଏ । ମଣାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ରୋଗ ଜନ୍ମାଇବାର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାଈ ମଣା ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼େ, ଏହି ଜୀବମାନେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ପରେ ସେମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁପ୍ତଜୀବମାନଙ୍କ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବସି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି । ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଘୁରିବୁଲନ୍ତି ଏବଂ

ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ରାବ କଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ି
ଥାଏ । ଦେହ ଭିତରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି
ରହନ୍ତି ।



ଏହି ରୋଗ ବିଶେଷ ଉତ୍ପତ୍ତିର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ
ସାମୟିକ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୱର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି
ପାଖାପାଖି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ । ଜ୍ୱର ହେବା ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ଗୋଡ଼ହାତ ଘୋଳାବିଳା ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଭୁବିଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ରୋଗୀକୁ ଏହିପରି ମାସେ କିମ୍ବା
ଦୁଇମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ । ଏହି ଜ୍ୱର ପାଞ୍ଚ ଦଶଥର ହେବା
ପରେ ଲସିକା ନଳୀ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଦରଜ ହୁଏ । ଗୋଡ଼ ହାତ
ଫୁଲି ଯାଏ । ଏହି ଜ୍ୱର ଫମାଗତ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଡ଼
କିମ୍ବା ହାତରେ ଚର୍ମ ଓ ଚର୍ମତନ୍ତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ
ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ । ଫଳରେ ରୋଗୀ
ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେକରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳା-
ମିଶା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏହି ପାଳିଜ୍ୱର ହେବାର ଅନୁମାନ ହେଲେ
ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘରେ ମଶାରି ବାନ୍ଧି ଶୁଆଇବା ଉଚିତ ।
ଜ୍ୱର କମିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲକରି

ଧୋଇ ପୋଛିଦେବା ଦରକାର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏକ-ବର୍ଷର ଦୁଇବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ରୋଗର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ନଚେତ୍ ଏହି ଜ୍ୱର ବର୍ଷର ସମୟ ସମୟରେ ଅନୟମିତ ଭାବରେ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲ ଏପରି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ହାତର ଗୋଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ମଣି ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣି କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀ ଶୋଇବା ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆଗଦା, ନଈମା, ନାଲ, ଅପରିଷ୍କାର ପୋଷା ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରି ଶାଢ଼ୀ ନାଶକ ଔଷଧ ଡି.ଡି.ଟି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣି ତଥା ଅଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଘରର ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦକରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିୟମିତ ଝୁଣା ଧୁଆଁ ଦେଲେ ମଣି ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଜାଣିପା ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମଣି ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନାଲ ନଈମାରେ ତେଲ ପକାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିନା ପଇସାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁକ୍ଷ୍ମ ନଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାର ଅଭାବ, ନାଲନଈମାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣିର ଅଭାବ ଏହି ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ବା ହୁକ ଡ୍ଵାନ

ଏହି କୃମି ଦେଖିବାକୁ ଅଙ୍କୁଶ ପରି । ଏହାର ମୁହଁଟି ବଙ୍କା ଓ ଏଥିରେ ଚୁରୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ । ଏହି କୃମିର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ବାଟ ଦେଇ ଦେହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ତ ସମ୍ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତୁତରୁ ବାୟୁନଳୀ ଭିତରକୁ ଆସି ଖଜାରବାଟେ ଶ୍ଵାସ-



ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ପରେ ଶାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଶାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ତନଳୀର ଉପରି ଭାଗରେ ରହନ୍ତି । ଏଠାରେ ନେମାଟେ ବଡ଼ ହୋଇ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦାନ୍ତଦ୍ଵାରା କାମୁଡ଼ି ଧରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ଖୋସି ବଞ୍ଚନ୍ତି । ଏହି କୃମି ରୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ-ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ବଡ଼ ହେଲାପରେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହି ଡିମ୍ବଦାନ । ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ାରେ ବାହାରକୁ ଆସେ । ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଛୁଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ସବୁ-ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ପାଦର ତମ୍ବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି ।

ବେଳେବେଳେ ଏହି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ପିଇବା ପାଣି ସହିତ ମିଶି ସହଜରେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ।

ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ରକ୍ତସ୍ନାନତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା । କୃମି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ରକ୍ତଶୋଷି ଖାଉଥିବା ଫଳରେ ଝିଡ଼ା ସହିତ ରକ୍ତ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ ପିରୁ ପରି କଳା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେଟ କ ମୁତ୍ରବା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହଜମ ନ ହେବା, ଶ୍ଳେଷ୍ମ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ରକ୍ତସ୍ନାନତା ଫଳରେ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୱେତ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମୁହଁ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ । ରୋଗୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପକିଛି କାମ କଲପରେ ବହୁତ ଡାଲିଆ ହୋଇପଡ଼େ । ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃତପିଣ୍ଡର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଖୋଲ ପଡ଼ିଆ ବା ବିଲରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ନ ଯାଇ ପାଦକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା ଭଳି ଜୋତାମାଡ଼ି ଯିବା ଉଚିତ । ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚପଲ ବିଶେଷ ଉପକାଶ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ବାଲି ସହଜରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ପାଦତଳ ଚର୍ମକୁ କଣାକରି କୃମି ପୋକର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ପାଇଖାନାକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଝାଡ଼ା ଯିବା ଉଚିତ । ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ନ ଥିଲେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ଗାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଅଳିଆ ଓ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବା ଦରକାର । ପରେ ଏହାକୁ ଖତ ରୂପେ ବଲବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସବୋକୃଷ୍ଣ । ନଳକୂପ ଅଭାବରୁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡାକରି ପିଇବା ଉଚିତ । ଏହାଛଡ଼ା ପାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଏହି କୃମିର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ

ପାଦରେ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବାହାରୁ ବୁଲୁଲୁଲୁ କରି ଆସିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ କୃମିର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମରିଯାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର । ଔଷଧ ଖାଇବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ଡିମ୍ବ ଥିଲେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଭଲ । ଏହା ଛଡ଼ା ପରିସ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନକା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗକୁ କେତେକାଂଶରେ କମାଇ ପାରିଥାଏ ।

*

କିଆ ବା କେଞ୍ଚୁଆ

ଏହି କୃମି ଦେଖିବାକୁ ଅବକଳ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା କିଆ ପରି । ମାତ୍ର ଏହା ଟିକିଏ ବେଶୀ ମୋଟା, ଲମ୍ବ ଓ ଶ୍ୱେତରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧନଳୀର ଭିତର ଭାଗରେ ରହନ୍ଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପାକପୁଲୀ ଭିତରକୁ ଆସି ବାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଟିବାଟେ ପଦାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ । ସମୟ ସମୟରେ ପାଟି ବାଟେ ନ ବାହାରି ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାକ ଭିତରକୁ ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଶ୍ୱେତ ପିଲଙ୍କ ନାକ କିମ୍ବା ଗଳା ନଳୀରେ ପଶିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପିଲର ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଅନ୍ଧନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ କୃମି ଗୁଡ଼ିକ ଡିମ୍ବ ଦେଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ଥାନ୍ତି ।

ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ା ସହିତ ମିଶି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ପାଣି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ରୋଗୀ ବଳବାଡ଼ିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ମେହ ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶି ରହନ୍ଥାନ୍ତି । ପରେ ମେହ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଫଳମୂଳ ଯଥା ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି ଓ ବଲୁଡ଼ ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା

ଥାଏ । ଏହି କୃମି ପିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମରେ ଏହି ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । ଅନ୍ତନଳୀରେ ଏହି ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ ବୃଦ୍ଧି କଲ-ପରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଘେଟ ବହୁତ ବଥା ହୁଏ । ଫାମି ଯାଏ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଜିଆ, ଝାଡ଼ା ତଥା ବାନ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପତାକୁ ବାହାର ଆସେ । ପିଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଶରୀରରେ ଶୋଇ ଥିବାବେଳେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼େ ଓ ବିଳବିଳାଏ । ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ । ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ଵେତ ନ ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲ ମାଟି, ପାଉଁଶ, ଚକ୍ଷୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଏ । ଗୋଡ଼ହାତ ପତଳା ହୋଇ ପେଟ ବାହାରକୁ ବାହାର ପଡ଼େ । ବେଳେ-ବେଳେ ଗ୍ରେଟ ପିଲଙ୍କୁ ଏହି କୃମି ସକାଶେ ପିନ୍ଧିଲା ମଧ୍ୟ ମାରେ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ସବଦା ଥଣ୍ଡା ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ । ମଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ । ବିଲବାଡ଼ି, ଖୋଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏଣେତେଣେ ଝାଡ଼ା ନ ଫେରି ପାଇଖାନାର ବଗିଚାବସ୍ତୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଗାଈ ଖୋଳ ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଉଚିତ । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଓ ପାଣିଦ୍ଵାରା ଧୋଇବା ବଧେୟ । ପିଲ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି କୃମିର ଉତ୍ତମ ଥିବାବେଳେ ପରମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଭଲ । ଥରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ହମାଗତ ୨/୩ଥର କିମ୍ବା ୭ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କୃମି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ତଥା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବଧେୟ ।